



Face au frelon à pattes jaunes

La lutte d'automne

Les recommandations du Groupe Frelon 67
(Fédération des Syndicats des Apiculteurs du Bas-Rhin et du GDS67 Groupement de Défense Sanitaire 67)



La situation de fin de saison

Côté ruches et ruchers

Côté frelons à pattes
jaunes

GF
67

Côté ruches et ruchers



La prédation est présente dans de nombreuses zones du Bas-Rhin, (cf. lefrelon.com)
Les conseils de protection ont été mis en place. Ils n'empêchent pas la prédation, mais, le plus important est que les abeilles puissent continuer leur travail. Le stress est moindre.



GF
67



Côté frelon à pattes jaunes



Les colonies se composent de près de 2000 insectes qui travaillent à nourrir leurs larves.

Les nids atteignent pour certains la taille de 80 cm et se situent en hauteurs dans les arbres mais aussi dans des zones abritées comme des arbustes, des cabanes, des hangars....

Dans peu de temps, la phase de reproduction va s'enclencher. Il y a déjà des frelons mâles dans la colonie et progressivement, ils vont augmenter. S'ensuivra la ponte des gynes, futures fondatrices.



GF

67



Que va-t-il se passer progressivement ?



Pour nourrir les larves liées à la reproduction, mais aussi pour engraisser ensuite les futures fondatrices, la nourriture du frelon à pattes jaunes va de plus en plus se diriger vers la matière protéique. Ce qui veut dire que sur les ruchers, la prédation va fortement augmenter. Pour rappel, 500 à 1000 gynes par nid vont coloniser l'environnement.



GF
67

Que faire ?





Il faut
PIEGER



On ne piège que sur des ruchers prédatés.

Il va falloir diriger les frelons en recherche de nourriture vers des pièges offrant plutôt de l'appât protéiné.

Il est recommandé de mettre plusieurs pièges dans le rucher, 2 étant un bon début.

Les pièges seront sur les côtés du rucher, devant derrière, à une hauteur de 50 cm à 1,5 m de hauteur

Le piège doit être SELECTIF, c'est le même principe qu'au printemps





Il faut
DES APPÂTS ADAPTÉS



Les appâts seront odorants mais devront être inaccessibles, comme au printemps.

Exemples d'appâts

Poisson frais ou légèrement abîmé (truite, sardine, maquereau, saumon, etc.)

- Viande crue (**poulet, dinde**, porc, bœuf, morceaux de steak haché)
- Abats (foie de volaille, gésiers...)
- **Crevettes** ou coquillages (chair de crevette, moule)
- Restes carnés (filets de poisson abîmés, peau de poulet, etc.)
- A couper en petits morceaux et à insérer dans le compartiment dédié du piège
- En rouge, les préférés à priori





Il faut GÉRER ET ENTREtenir LES PIÈGES



- Changer l'appât régulièrement (/3jours) car il se dessèche et perd de son attrait.
- Vider les frelons piégés en prudence.
- Laisser des frelons dedans attire les autres frelons.
- Si un piège est inefficace, déplacez-le, changez d'appât.



GF

67

Objectifs



Attraper le plus de frelons possibles, voir même quelques futures fondatrices, c'est possible, mais par contre les discerner des ouvrières est quasi impossible.

La prédation ne s'arrêtera pas, mais cela affaiblira le nid.

Il y aura moins de frelons autour des ruches.





GF
67

C'est aussi le moment



De continuer à chercher les nids.

La tâche n'est pas simple et s'aguerrir à la technique du pot à mèche est très chronophage (de quelques heures à plusieurs jours), mais si elle est payante, c'est tout bénéfice pour nos colonies.

De continuer à informer autour de soi, parce que ce n'est pas que dans les arbres, mais aussi dans les haies, les arbustes, les hangars, les cabanons....que l'on trouve des nids.



GF

67

Conclusion



Le frelon à pattes jaunes sera malheureusement une problématique supplémentaire à la gestion de nos cheptels qu'ils soient petits ou grands. Les stratégies de lutttes vont encore évoluer, sans doute s'améliorer, peut-être se simplifier. Une chose est sûre, dès maintenant, il faut signaler, dès cet hiver, il faudra continuer d'informer, et au printemps, il faudra à nouveau piéger.

